

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

## Product Datasheet

### Jejunum Diabetic Disease Lysate PRS-XBL-10381

|                          |                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelname              | Jejunum Diabetic Disease Lysate                                                                                      |
| Artikelnummer            | PRS-XBL-10381                                                                                                        |
| Hersteller Artikelnummer | XBL-10381                                                                                                            |
| Alternativnummer         | PRS-XBL-10381-0.1                                                                                                    |
| Hersteller               | ProSci                                                                                                               |
| Kategorie                | Zellen/Zellkultur                                                                                                    |
| Applikation              | WB                                                                                                                   |
| Konzentration            | 2 mg/mL or better                                                                                                    |
| Puffer                   | HEPES pH 7.9, MgCl <sub>2</sub> , KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, and NP-40.                      |
| Formulierung             | Liquid                                                                                                               |
| Anwendungsbeschreibung   | Small Intestine: Jejunum lysate is for use in Western blotting, 10 µg to 20 µg per lane is recommended for mini gel. |